

化学肥料施用量及び化学合成農薬成分回数の慣行基準

令和5(2023)年3月8日

No.	作 目	作 型 等	は種又は 移植時期 (目安)	化学肥料施用量 (窒素分量:kg/10 a)	化学合成農薬の 成分使用回数
1	水稲	早植栽培(コシヒカリ)	～5月20日	6	14
		早植栽培(コシヒカリ以外)		8	
		普通植栽培	5月21日～	7	
2	二条大麦		10下～11中	7	5
3	六条大麦		10下～11中	7	5
4	小麦	製粉用	10下～11中	7	5
		醸造用	10下～11中	13	5
		パン用	10下～11中	15	5
5	大豆		6中～下	2	11
6	そば		8中～9上	2	0
7	はとむぎ		5上～下	13	6
8	さといも		3下～4上	22	5
9	ばれいしょ		3中	10	7
10	かんしょ		5中	4	11
11	やまのいも			22	7
12	いちご	促成	8上～9下	20	50
13	トマト	促成(長期どり)	7中～8上	45	41
		促成(冬春どり)	8下～9下	30	34
		普通(夏秋どり)	1上～2上	30	22
14	なす	促成	7上～8上	45	47
		半促成	11上～12上	44	25
		普通(夏秋どり)	2上～下	30	34
15	きゅうり	促成(冬春どり)	9上～12上	40	51
		半促成(初夏どり)	1上～3上	35	28
		普通(夏秋どり)	3上～4上	30	36
	抑制(秋どり)	7上～8下	15	28	
16	メロン			11	15
17	かぼちゃ		3上～4上	12	7
18	すいか		2下～	20	12
19	にがうり			27	8
20	ズッキーニ		4上～5中	20	8
21	だいこん	春どり	11下～1上	15	5
		夏どり	5下～7下	18	6
		秋冬どり	8下～9中	15	8
22	かぶ		1下～6中	16	6
23	にんじん	秋冬どり	7下～8上	13	11
24	ごぼう	秋どり	3下～5中	23	5
25	にら			42	24
26	ねぎ	夏どり	2下～3下	15	17
		冬春どり	3下～4中	20	19
27	たまねぎ		9上	22	17
28	らっきょう		9中	12	3
29	はくさい	春どり	1上～1下	17	6
		秋冬どり	8中	19	12
30	キャベツ	初夏どり	9下～2下	15	12
		秋冬どり	6中～7中	17	12
31	ほうれんそう	夏どり	5下～8下	18	8
		冬春どり	10上～11下	17	8
32	レタス	秋冬どり	8上～9上	15	11
		春どり	9上～1中	18	8
33	しゅんぎく	冬春どり	9下～10下	25	10
34	なばな類			21	1
35	ブロッコリー	春夏どり	3上～4中	22	8
		秋どり	7上～8下	22	10
36	カリフラワー	秋どり	7中	16	4
37	うど		4中～5中	12	8
38	アスパラガス			34	20
39	ふき			10	2
40	にんにく			19	13
41	しょうが		4中～4下	22	19
42	未成熟とうもろこし		3上～5中	23	8
43	さやえんどう			8	3
44	えだまめ	露地	5中～7下	9	7
45	オクラ		5上～5下	18	4
46	なし	露地		20	41
47	ぶどう	露地		8	26
		ハウス		8	16
48	りんご	露地		6	48
49	もも	露地		10	26
50	おうとう	雨よけ		8	22
51	うめ	露地		10	9
52	くり	露地		15	7
53	ブルーベリー	露地		5	5
54	きく	スプレー		20	23
		輪ぎく		25	33
55	カーネーション			29	31
56	りんどう			23	29
57	トルコギキョウ			8	40
58	ゆうがお	露地	3下～4上	30	12
59	こんにゃく		5中～6上	14	9
60	茶			46	12
61	飼料用米※			11	9
62	飼料用イネ※			11	7
63	飼料用とうもろこし		4下～6下	8	4
64	イタリアンライグラス		9下～10下	9	1

※専用品種