


安足地域水稻技術情報 No. 2

令和 8 (2026) 年 7 月 24 日
安足農業振興事務所

○ 早めに間断かん水に移行しましょう

1 気象概況（観測地点：アメダス（佐野））



6 月は、平均気温が平年差+0.1℃で平年並みとなり、降水量は平年比 197%と平年を大きく上回りました。

2 水稻生育診断ほ生育調査結果

平年と比較して、草丈はやや長く、茎数は少なく、葉齢から判断すると生育は 4 日程度遅れています。

表 1 生育調査結果（令和 8 年 7 月 6 日調査）

項目	本年	平年	平年比・差
草丈	34.6	31.6	109%
茎数	152	194	78%
葉齢	6.7	7.5	-0.8
葉色（葉色板）	4.5	4.1	0.4
葉色（SPAD）	40.4	40.6	-0.2

注) 平年値：令和 3～7 年の 5 か年平均

移植日：令和 8 年 6 月 15 日

品 種：とちぎの星



写真 1 現在の稲の様子（7 月 6 日撮影）

3 今後の気象

気象庁が7月9日に発表した1か月予報によると、向こう1か月の平均気温は「高い」、降水は「少ない」、日照時間は「平年並み」と予想されています。

表2 関東甲信地方(栃木県)の1か月予報(2026年7月9日14時30分気象庁発表)

気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)			
気温	関東甲信地方	向こう1か月 07/11~08/10	10 40 50
		1週目 07/11~07/17	10 20 70
		2週目 07/18~07/24	10 40 50
		3~4週目 07/25~08/07	20 40 40
降水量	関東甲信地方	向こう1か月 07/11~08/10	40 30 30
日照時間	関東甲信地方	向こう1か月 07/11~08/10	30 40 30

■ 低い(少ない) ■ 平年並 ■ 高い(多い)

4 これからの作業のポイント

○早めの間断かん水で、稲の根に酸素を供給

わらをすき込んだほ場では、気温の上昇に伴ってガスが発生(写真)し、稲の根腐れや生育停滞を引き起こすことがあります。移植後25日頃から間断かん水(図)に切り替えてガス抜きを行い、根の健全な生育を促しましょう。



写真2 ガスが発生しているほ場(水田に足を踏み込んだ際に、多量の気泡が発生)



図 間断かん水のイメージ

問い合わせ先

安足農業振興事務所 経営普及部 農畜産課

TEL: 0283-23-1431 URL: <https://www.pref.tochigi.lg.jp/g58/index.html>