

病害虫発生現況情報(令和5(2023)年3月)

栃木県農業環境指導センター

大麦(縞萎縮病)

発生ほ場率(%)

	発生ほ場率	備考
本年平均値	4.7	調査ほ場数: 1,631 調査年月日: 令和5(2023)年3月7,8日 車上、定点調査 ※ $ \text{平年比} = (\text{本年平均値} / \text{平年値}) \times 100$
平年値	1.8	
平年比	260.3	
発生程度	多	
概評	多	

いちご

単位: %

		炭疽病	灰色かび病	うどんこ病	萎黄病	アブラムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ幼虫	シロイチモジヨトウ幼虫	アザミウマ類(花)	備考
ほ場率	発生ほ場数	7	4	2	5	11	17	19	0	0	7	総調査ほ場数: 65か所 総調査株数: 1,625株 (調査株数 25株 (調査花数50花)) ※ $ \text{平年比} = (\text{本年平均値} / \text{平年値}) \times 100$
	本年平均値	10.8	6.2	3.1	7.7	16.9	26.2	29.2	0.0	0.0	10.8	
	平年値	7.8	10.2	3.3	11.9	10.3	48.3	25.7	0.0	0.0	24.8	
	平年比	138.5	60.8	93.9	64.7	164.1	54.2	113.6	-	-	43.5	
	発生程度	平年並	平年並	平年並	平年並	やや多	やや少	平年並	少	少	やや少	
発生株率	発生株数	3	4	0	1	34	212	84	0	0	28	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	0.2	0.2	0.0	0.1	2.1	13.0	5.2	0.0	0.0	0.9	
	平年値	0.1	0.3	0.1	0.1	1.1	13.1	3.6	0.0	0.0	1.9	
	平年比	200.0	66.7	0.0	100.0	190.9	99.2	144.4	-	-	47.4	
	発生程度	多	平年並	少	平年並	多	平年並	やや多	少	少	やや少	
概評	やや多	平年並	やや少	平年並	やや多	やや少	平年並	少	少	やや少		

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

単位: %

		灰色かび病	疫病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	黄化葉巻病	モザイク病	アブラムシ類	コナジラミ類(葉率)	ハモグリバエ類幼虫	タバコガ類幼虫および被害	ハスモンヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	4	1	1	0	4	1	0	0	3	0	0	0	総調査ほ場数: 21か所 総調査株数: 1,050株 (調査数:50株、100果、葉かび・すすかび150葉、その他100葉) 冬春トマト ※コナジラミ類は2014年以降は葉率。以前は株率のため、平年値は参考値。 ※タバコガ類幼虫および被害は2016.6~。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	本年平均値	19.0	4.8	4.8	0.0	19.0	4.8	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	
	平年値	41.8	0.9	14.4	0.9	9.4	13.9	0.0	0.0	15.7	0.5	0.0	0.0	
	平年比	45.5	533.3	33.3	0.0	202.1	34.5	-	-	91.1	0.0	-	-	
	発生程度	やや少	多	やや少	少	多	やや少	少	少	平年並	少	少	少	
葉率・株率	発生株数	6	0	1	0	75	0	0	0	9	0	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	0.6	0.0	0.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.7	0.0	3.5	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	
	平年比	35.3	-	2.9	-	1014.3	0.0	-	-	133.3	-	-	-	
	発生程度	やや少	少	少	少	多	少	少	少	平年並	少	少	少	
概評	やや少	平年並	やや少	少	多	やや少	少	少	平年並	少	少	少		

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

単位: %

		灰色かび病(株率)	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病(株率)	モザイク病(株率)	黄化えそ病(株率)	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	コナジラミ類	ハダニ類	ハスモンヨトウ幼虫(株率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	2	3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	総調査ほ場数: 9か所 総調査葉数: 900葉 総調査株数: 225株 (調査葉数 100葉) (調査株数 25株) ※ $ \text{平年比} = (\text{本年平均値} / \text{平年値}) \times 100$ ※灰色かび病は2014年度から、ハスモン幼虫は2016年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病は2017年度から株率調査。それ以前は、葉率調査のため平年値は参考値。 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	0.0	22.2	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	
	平年値	3.3	13.4	35.6	9.2	0.0	0.9	11.7	5.2	12.7	2.2	7.3	1.1	1.0	
	平年比	0.0	165.7	93.5	0.0	-	0.0	0.0	213.5	0.0	0.0	304.1	0.0	0.0	
	発生程度	少	やや多	平年並	少	少	少	少	少	多	少	少	多	少	
葉率・株率	発生葉・株数	0	16	17	0	0	0	0	73	0	0	52	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	0.0	1.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	
	平年値	0.0	1.6	4.0	0.2	0.0	0.0	1.1	0.1	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	
	平年比	-	112.5	47.5	0.0	-	-	0.0	8100.0	0.0	-	966.7	-	-	
	発生程度	少	平年並	やや少	少	少	少	少	多	少	少	多	少	少	
概評	少	やや多	平年並	少	少	少	少	少	多	少	少	多	(少)	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

にら

単位：％

		白斑葉枯病	乾腐病	さび病	株腐細菌病	ネダニ類	アザミウマ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	1	0	0	1	0	総調査ほ場数：20か所 総調査株数：1,000株 (調査株数 50株) ※ $年平均比 = (平均値 / 平年値) \times 100$ ※株率の平年値は過去10年の値
	本年平均値	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	0.0	
	平年値	9.0	6.2	0.0	0.0	17.2	1.5	
	平年比	0.0	80.6	-	-	29.1	0.0	
	発生程度	少	平年並	少	少	やや少	少	
株率	発生株数	0	0	0	0	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.5	0.1	0.0	0.0	0.8	0.1	
	平年比	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	
概 評		少	やや少	少	(少)	やや少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

たまねぎ

単位：％

		さび病	べと病	白色疫病	黒斑病	灰色かび病	黒点葉枯病	ポトリチス葉枯病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：6か所 総調査株数：300株 (調査株数 50株) ※ $年平均比 = (本年平均値 / 平年値) \times 100$ ※白色疫病はH28.4から調査開始。
	本年平均値	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.0	23.2	-	0.0	0.0	15.6	0.0	3.1	12.5	0.0	
	平年比	-	215.5	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	
	発生程度	少	多	少	少	少	少	少	少	少	少	
株率	発生株数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※たまねぎの3月巡回調査は平年値を2011～2013, 2020年～のデータで算出。
	本年平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.1	-	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	2.0	0.0	
	平年比	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	
概 評		少	平年並	少	少	少	(少)	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位：％

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	5	0	0	0	0	総調査ほ場数：9か所 総調査株数：450株 (調査株数 50株) ※ $年平均比 = (平均値 / 平年値) \times 100$
	本年平均値	0.0	0.0	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	10.0	2.0	35.9	8.9	0.0	0.0	0.0	
	平年比	0.0	0.0	154.9	0.0	-	-	-	
	発生程度	少	少	やや多	少	少	少	少	
株率	発生株数	0	0	23	0	0	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.7	0.3	8.0	0.8	0.0	0.0	0.0	
	平年比	0.0	0.0	63.8	0.0	-	-	-	
	発生程度	少	少	平年並	少	少	少	少	
概 評		少	少	やや多	少	(少)	(少)	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す