

病害虫発生現況情報(令和6(2024)年3月)

栃木県農業環境指導センター

大麦(縞萎縮病)

発生ほ場率(%)

	発生ほ場率	備考
本年値	2.5	調査ほ場数: 1,718
平年値	2.2	調査年月日: 令和6(2024)年3月1, 4, 7日
平年比	113.1	車上、定点調査
発生程度	平年並	※本年値は、本年の場所ごとの調査結果の平均値を示す
概評	平年並	※平年比=(本年値/平年値)×100

いちご

単位: %

		炭疽病	灰色かび病	うどんこ病	萎黄病	アブラムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ幼虫	シロイチモジヨトウ幼虫	アザミウマ類(花)	備考
ほ場率	発生ほ場数	4	2	0	0	7	8	2	0	0	9	総調査ほ場数: 65か所 総調査株数: 1,625株 (調査株数 25株) ※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比=(本年値/平年値)×100
	本年値	6.2	3.1	0.0	0.0	10.8	12.3	3.1	0.0	0.0	13.8	
	平年値	8.5	9.5	2.9	11.8	10.8	44.2	26.2	0.0	0.0	23.0	
	平年比	72.9	32.6	0.0	0.0	100.0	27.8	11.8	-	-	60.0	
発生株率	発生株数	3	2	0	0	65	58	8	0	0	23	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.2	0.1	0.0	0.0	4.0	3.6	0.5	0.0	0.0	1.4	
	平年値	0.1	0.2	0.1	0.1	1.2	12.1	3.7	0.0	0.0	1.8	
	平年比	200.0	50.0	0.0	0.0	333.3	29.8	13.5	-	-	77.8	
概評	多	やや少	少	少	多	やや少	少	少	少	少	平年並	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

単位: %

		灰色かび病	疫病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	黄化葉巻病	モザイク病	青枯病	萎黄病	アブラムシ類	コナジラミ類(葉巻)	アザミウマ類(花巻)	ハモグリバエ類幼虫	タバコガ類幼虫および被害	ハスモンヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	6	0	1	0	1	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	総調査ほ場数: 22か所 総調査株数: 1,100株 (調査株数: 50株、100果、葉かび/すすかび/150葉、その他100葉) 冬春トマト ※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比=(本年値/平年値)×100
	本年値	27.3	0.0	4.5	0.0	4.5	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	39.2	1.3	13.5	0.4	10.9	11.7	0.0	-	-	0.0	23.1	0.0	0.5	0.0	0.0	
	平年比	69.6	0.0	33.3	0.0	41.3	194.0	-	-	-	-	39.4	-	0.0	-	-	
葉率・株率	発生株数	0	0	1	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	※タバコガ類幼虫および被害は2016.6~。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値 ※コナジラミ類は2014年以降は葉巻。以前は株率のため、平年値は参考値。 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	1.1	0.0	0.3	0.0	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
	平年値	1.7	0.0	3.2	0.0	1.4	0.4	0.0	-	-	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0		
	平年比	64.7	-	9.4	-	7.1	200.0	-	-	-	-	33.3	-	-	-		
概評	平年並	少	少	少	少	多	少	少	少	少	やや少	少	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

単位: %

		灰色かび病(株率)	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病(株率)	モザイク病(株率)	黄化えそ病(株率)	炭疽病	斑点細菌病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	コナジラミ類	ハダニ類	ハスモンヨトウ幼虫(株率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	1	3	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	総調査ほ場数: 10か所 総調査葉数: 1,000葉 総調査株数: 250株 (調査葉数 100葉) (調査株数 25株) ※平年比=(本年値/平年値)×100 ※本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※灰色かび病はH26年度から、ハスモンヨトウ幼虫はH28年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病はH29年度から株率調査。それ以前は、葉率調査のため平年値は参考値。炭疽病、斑点細菌病はR5年度から調査。
	本年値	10.0	10.0	30.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	20.0	0.0	0.0	
	平年値	2.0	14.3	36.4	8.0	0.0	0.9	11.7	-	-	6.3	10.2	0.9	9.6	1.1	1.0	
	平年比	500.0	69.9	82.4	0.0	-	0.0	85.5	-	-	0.0	98.0	1111.1	208.3	0.0	0.0	
葉率・株率	発生葉・株数	11	60	9	0	0	0	1	12	0	0	7	1	15	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	4.4	6.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	0.0	0.0	0.7	0.1	1.5	0.0	0.0	
	平年値	0.0	1.6	3.5	0.1	0.0	0.0	1.1	-	-	0.9	0.6	0.0	1.2	0.0	0.0	
	平年比	-	375.0	25.7	0.0	-	-	36.4	-	-	0.0	116.7	-	125.0	-	-	
概評	(やや多)	やや多	平年並	少	少	少	少	やや少	-	-	少	平年並	-	平年並	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

にら

単位：%

		白斑葉枯病	乾腐病	さび病	株腐細菌病	ネダニ類	アザミウマ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	2	2	0	0	1	0	総調査ほ場数：20か所
	本年値	10.0	10.0	0.0	0.0	5.0	0.0	総調査株数：1,000株
	平年値	8.4	5.7	0.0	0.0	16.1	1.5	(調査株数 50株)
	平年比	119.0	175.4	-	-	31.1	0.0	※平年比=(平均値/平年値)×100
株率	発生株数	11	1	0	0	0	0	※株率の平年値は過去10年の値
	本年値	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	※本年値は、本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	平年値	1.4	0.1	0.0	0.0	0.7	0.1	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年比	78.6	100.0	-	-	0.0	0.0	
概 評		平年並	平年並	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

たまねぎ

単位：%

		さび病	べと病	白色疫病	黒斑病	灰色かび病	黒点葉枯病	ポトリテス葉枯病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	総調査ほ場数：7か所
	本年平均値	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	総調査株数：350株
	平年値	0.0	35.7	-	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	17.4	0.0	(調査株数 50株)
	平年比	-	40.1	-	-	-	-	-	0.0	164.4	-	※平年比=(本年平均値/平年値)×100
株率	発生株数	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	※白色疫病はH28.4から調査開始。
	本年平均値	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年値	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	※3月巡回調査の平年値は2020.3~の平均値。
	平年比	-	600.0	-	-	-	-	-	-	141.7	-	
概 評		少	平年並	少	少	少	(少)	少	少	やや多	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位：%

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	4	1	0	0	0	総調査ほ場数：10か所
	本年値	0.0	0.0	40.0	10.0	0.0	0.0	0.0	総調査株数：500株
	平年値	10.0	2.0	38.1	6.7	0.0	0.0	0.0	(調査株数 50株)
	平年比	0.0	0.0	105.0	149.3	-	-	-	※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
株率	発生株数	0	0	25	2	0	0	0	※平年比=(平均値/平年値)×100
	本年値	0.0	0.0	5.0	0.4	0.0	0.0	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年値	0.7	0.3	8.0	0.7	0.0	0.0	0.0	
	平年比	0.0	0.0	62.5	57.1	-	-	-	
概 評		少	少	平年並	やや少	少	(少)	少	※シロイチモジヨトウの発生はなかった。

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す