BLASTAMによる葉いもち感染好適条件判定結果（令和7年度）

●:感染好適条件　○[1~4]:準感染好適条件　ー:感染好適条件なし

●感染好適条件:湿潤時間中の平均気温が15～25℃であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20～25℃の範囲にある

○準感染好適条件:好適条件に準ずる気象条件
準感染好適条件1:湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が20℃未満
準感染好適条件2:湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が25℃以上
準感染好適条件3:湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15～25℃の範囲外
準感染好適条件4:湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い

※上記条件であっても、3mを越える風や時間雨量3mmを越える雨があると湿潤時間の継続が打ち切りとなり、感染好適条件でなくなる場合がある

感染好適条件が出現した日から７～１０日後に発病する可能性がありますので、
ほ場をよく観察し、いもち病の発生状況に応じて、適期に防除を行いましょう。

日付	那須	黒磯	大田原	塩谷	真岡	宇都宮	今市	鹿沼	小山	佐野
6/01	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○3	ー	ー	ー
6/02	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○4	○4	ー
6/03	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○1
6/04	○3	○4	○4	○4	ー	ー	○3	ー	ー	ー
6/05	ー	ー	ー	○4	ー	ー	○3	○4	ー	ー
6/06	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
6/07	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
6/08	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
6/09	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
6/10	ー	ー	ー	ー	●	○4	ー	ー	●	●
6/11	○1	●	●	●	●	●	○1	●	●	●
6/12	ー	ー	○4	●	ー	ー	ー	●	ー	ー
6/13	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
6/14	○4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
6/15	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
6/16	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー
6/17	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
6/18	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー