

大麦(縞萎縮病)

項目	発生ほ場率	備考
発生ほ場数(ほ場)	4	調査ほ場数: 32ほ場 調査年月日: 令和7(2025)年3月 3～6日 ※平年値は平成28(2016)年～ 令和6(2024)年の値の平均値 ※平年比=(本年値/平年値)×100
本年値(%)	12.5	
平年値(%)	9.7	
平年比(%)	128.6	
発生程度	平年並	
概評	平年並	

いちご

		炭疽病	灰色か び病	うどん こ病	萎黄病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	コナジ ラミ類	ハスモ ンヨト ウ幼虫	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫	アザ ミウ マ類 (花)	備考
ほ場率	発生ほ場数	4	3	6	1	7	13	5	0	0	25	総調査ほ場数: 63か所 総調査株数: 1,575株 (調査株数 25株) ※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比=(本年値/平年値)×100
	本年値	6.3	4.8	9.5	1.6	11.1	20.6	7.9	0.0	0.0	39.7	
	平年値	9.2	7.6	2.6	9.3	10.7	38.7	25.0	0.0	0.0	22.1	
	平年比	68.5	63.2	365.4	17.2	103.7	53.2	31.6	-	-	179.6	
発生株 率	発生程度	平年並	平年並	多	少	平年並	やや少	やや少	少	少	やや多	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生 が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生株数	1	2	17	0	13	103	12	0	0	156	
	本年値	0.1	0.1	1.1	0.0	0.8	6.5	0.8	0.0	0.0	5.0	
	平年値	0.1	0.2	0.1	0.1	1.5	10.4	3.6	0.0	0.0	1.8	
概 評	平年比	100.0	50.0	1100.0	0.0	53.3	62.5	22.2	-	-	277.8	
	発生程度	平年並	やや少	多	少	やや少	平年並	やや少	少	少	多	
概 評		平年並	平年並	多	少	平年並	やや少	やや少	少	少	やや多	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

		灰色か び病	疫病	葉か び病	すす かび病	うどん こ病	黄化 葉巻 病	モザ イク病	青枯 病	萎凋 病	アブラ ムシ類	コナ ジラミ 類(葉 率)	アザ ミウ マ類(花 率)	ハモ グリ バエ 類幼虫	タバ コガ 類幼虫 および 被害	ハス モン ヨト ウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	2	0	0	0	5	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	総調査ほ場数: 20か所 総調査株数: 1,000株 (調査数:50株、100花・果、葉かび・すすかび150葉、その他100葉) 冬春トマト ※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比=(本年値/平年値)×100
	本年値	10.0	0.0	0.0	0.0	25.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	37.7	1.3	11.9	0.4	9.2	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.5	0.0	0.0	
	平年比	26.5	0.0	0.0	0.0	271.7	168.1	-	-	-	-	187.5	-	0.0	-	-	
葉率・株 率	発生程度	やや少	少	少	少	多	やや多	少	少	少	少	多	少	少	少	少	※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前は幼虫調査のため、平 年値は参考値。 ※コナジラミ類は2014年以降は葉率。以前は株率のため、平年値は参 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる 場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生株数	3	0	0	0	28	17	0	0	0	0	21	0	0	0	0	
	本年値	0.3	0.0	0.0	0.0	2.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.8	0.0	2.4	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
概 評	平年比	16.7	-	0.0	-	215.4	425.0	-	-	-	-	366.7	-	-	-	-	
	発生程度	少	少	少	少	多	多	少	少	少	少	多	少	少	少	少	
概 評		やや少	少	少	少	多	やや多	少	少	少	少	多	少	少	少	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

		灰色か び病(株率)	べと 病	うどん こ病	褐斑 病	疫病 (株率)	モザイク 病(株率)	黄化え そ病(株率)	炭疽 病	斑点 細菌 病	アブラ ムシ類	アザ ミウ マ類	ハモ グリ バエ 類幼虫	コナ ジラミ 類	ハダ ニ類	ハスモ ンヨト ウ幼虫 (株率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	3	4	3	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	0	総調査ほ場数: 9か所 総調査葉数: 900葉 総調査株数: 225株 (調査葉数 100葉) (調査株数 25株)
	本年値	11.1	33.3	44.4	33.3	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	11.1	22.2	0.0	22.2	0.0	0.0	
	平年値	3.0	14.4	38.5	6.1	0.0	0.9	9.0	10.0	0	6.3	10.2	1.0	11.6	1.1	1.0	
	平年比	370.0	231.3	115.3	545.9	-	0.0	123.3	0.0	-	176.2	217.6	0.0	191.4	0.0	0.0	
葉率・株 率	発生程度	多	多	平年並	多	少	少	平年並	-	-	やや多	多	少	多	少	少	※平年比=(本年値/平年値)×100 [本年値 は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す] ※灰色かび病はH26年度から、ハモグリ幼虫はH28 年度から株率調査。それ以前の平年値は参考 値。炭疽病、斑点細菌病はR5年度から調査。 ※調査株数にカウントされるほどではない が、ほ場内で発生が見られる場合は散見として 発生ほ場数にカウント
	発生葉・株数	1	15	22	11	0	0	6	0	0	4	2	0	3	0	0	
	本年値	0.4	1.7	2.4	1.2	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	
	平年値	0.5	2.0	3.0	0.1	0.0	0.0	0.7	1.2	0.0	0.9	0.6	0.0	1.3	0.0	0.0	
概 評	平年比	80.0	85.0	80.0	1200.0	-	-	385.7	0.0	-	44.4	33.3	-	23.1	-	-	
	発生程度	平年並	平年並	平年並	多	少	少	多	-	-	やや少	やや少	少	やや多	少	少	
概 評		やや多	やや多	平年並	多	少	少	やや多	(少)	(少)	平年並	やや多	少	やや多	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

にら

		白斑葉枯病	乾腐病	さび病	株腐細菌病	ネダニ類	アザミウマ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	4	0	0	2	0	総調査ほ場数：20か所 総調査株数：1,000株 (調査株数 50株) ※ $\text{平年比} = (\text{平均値} / \text{平年値}) \times 100$ ※株率の平年値は過去10年の値 ※本年値は、本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	20.0	0.0	0.0	10.0	0.0	
	平年値	8.4	6.7	0.0	0.0	14.5	1.5	
	平年比	0.0	298.5	-	-	69.0	0.0	
	発生程度	少	多	少	少	平年並	少	
株率	発生株数	0	7	0	0	5	0	
	本年値	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.0	
	平年値	1.5	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	
	平年比	0.0	700.0	-	-	83.3	0.0	
	発生程度	少	多	少	少	平年並	少	
概 評		少	多	少	少	平年並	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

たまねぎ

		べと病	備考
ほ場率	発生ほ場数	4	総調査ほ場数：6か所 総調査株数：1,800株 (調査株数 300株) ※ $\text{平年比} = (\text{本年平均値} / \text{平年値}) \times 100$
	本年平均値	66.7	
	平年値	31.4	
	平年比	212.4	
	発生程度	多	
株率	発生株数	23	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※3月巡回調査の平年値は2020.3～の平均値。
	本年平均値	1.3	
	平年値	0.2	
	平年比	650.0	
	発生程度	多	
概 評		多	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	1	1	1	0	0	0	総調査ほ場数：9か所 総調査株数：450株 (調査株数 50株) ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※ $\text{平年比} = (\text{平均値} / \text{平年値}) \times 100$ ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※シロイチモジヨトウの発生はなかった。
	本年値	0.0	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	
	平年値	10.0	1.0	40.1	6.7	0.0	0.0	0.0	
	平年比	0.0	1110.0	27.7	165.7	-	-	-	
	発生程度	少	多	やや少	やや多	少	少	少	
株率	発生株数	0	0	40	1	0	0	0	
	本年値	0.0	0.0	8.9	0.2	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.7	0.2	8.2	0.6	0.0	0.0	0.0	
	平年比	0.0	0.0	108.5	33.3	-	-	-	
	発生程度	少	少	平年並	やや少	少	少	少	
概 評		少	平年並	やや少	平年並	(少)	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す