イネミズゾウムシ

単位：%

		被害株	成虫数	備考
発生ほ場数		11	7	総調査地点数：12（1地点2ほ場、計12ほ場）
ほ場率 (%)	本年値(%)	91.7	58.3	調査株数：50株/1ほ場 平年値：平成27(2015)～令和6(2024)年の10年間平均 平年比：平均値/平年値×100
	平年値(%)	70.0	50.0	
	平年比(%)	131.0	116.7	
	発生程度	平年並	平年並	
発生数(株・頭)		440	38	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
被害株率 (%) ・成虫数 (頭/100株)	本年値	36.7	3.2	
	平年値	25.1	3.9	
	平年比(%)	146.2	80.5	
	発生程度	やや多	平年並	
概 評		平年並		

イネドロオウムシ

単位：%

		イネドロ オウムシ 発生株 (株数)	イネドロ オウムシ 成虫数 (頭数)	イネドロ オウムシ 卵塊数	イネドロ オウムシ 幼虫数 (頭数)	備考
発生ほ場数(か所)		1	0	1	0	総調査地点数：12（1地点2ほ場調査、計12ほ場） (調査株数 50株/ほ場)
発 生 ほ場率 (%)	本年値(%)	8.3	0.0	8.3	0.0	畦畔から3～4m内側(10条付近)の50株調査 平年比＝(平均値/平年値×100)
	平年値(%)	14.2	15.8	6.7	5.8	
	平年比(%)	58.5	0.0	123.9	0.0	
	発生程度	やや少	少	平年並	少	
発生数(頭・卵塊)		1	0	1	0	平年値：平成27(2015)～令和6(2024)年の10年間平均
発生 程度 (%)	本年値	0.1	0.0	0.1	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年値	0.2	0.2	0.2	0.2	
	平年比(%)	50.0	0.0	50.0	0.0	
	発生程度	やや少	少	やや少	少	
概 評		やや少				

大麦でのヒメビウカ密度

単位：%

		ウシカ類幼 虫	ヒメトビウ カ短翅成 虫	ヒメトビウ カ長翅成 虫♀	ヒメトビウ カ長翅成 虫♂	ヒメトビウ カ成虫計	ヒメトビウ カ計	備考
発生ほ場数		16	0	0	0	0	16	総調査ほ場数：17ほ場
ほ場率 (%)	平均値(%)	94.1	0.0	0.0	0.0	0.0	94.1	調査方法：背負型動力機を使用した吹き出し法で 0.3m×11mを吹き出しすくい取り調査した。 ※頭数合計は10㎡あたりの頭数の換算値(×3)。 発生密度は麦上部、下部の合計値(頭/10㎡)。
	平年値(%)	97.8	4.9	20.2	14.1	25.6	97.8	
	平年比(%)	96.2	0.0	0.0	0.0	0.0	96.2	
発生程度		平年並	少	少	少	少	平年並	
第1世代密度 全調査地点合計		846	0	0	0	0	846	
密度 (頭/10㎡)	平均値	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0	49.8	平年値：平成27(2015)～令和6(2024)年の10年間平均
	平年値	136.8	0.3	1.7	1.4	3.4	140.1	
	平年比(%)	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	
発生程度		やや少	少	少	少	少	やや少	
概 評		やや少	少	少	少	少	平年並	

麦類赤かび病(5月下旬)

単位：%

		赤かび病	備 考
発生ほ場数		40	令和7(2025)年5月13日～20日調査
ほ場率	本年値	87.0	総調査ほ場数：46 総調査穂数：4600 (調査穂数 100穂/ほ場)
	平年値	42.6	
	平年比	204.0	
	発生程度	多	
発生穂率	発生穂数	114	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の 平均値を示す ※平年比＝(本年値/平年値)×100 ※調査穂数にカウントされるほどではない が、ほ場内で発生が見られる場合は散見とし て発生ほ場数にカウント
	本年値	2.5	
	平年値	1.0	
	平年比	250.4	
発生程度		多	
概 評		多	

いちご

単位：%

		炭疽病	灰色かび病	うどんこ病	萎黄病	アブラムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ幼虫	シロイチモジヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	13	0	13	28	4	0	0	総調査ほ場数：56か所 総調査株数：1,375株 (調査株数 25株) ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	本年値	0.0	0.0	23.2	0.0	23.2	50.0	7.1	0.0	0.0	
	平年値	2.7	0.2	10.7	0.2	28.0	54.6	13.6	0.5	0.0	
	平年比	0.0	0.0	216.8	0.0	82.9	91.6	52.2	0.0	-	
発生株率	発生株数	0	0	72	0	124	254	14	0	0	※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	0.0	5.2	0.0	9.0	18.5	1.0	0.0	0.0	
	平年値	0.1	0.0	1.4	0.0	6.7	15.8	1.6	0.0	0.0	
	平年比	0.0	-	371.4	-	134.3	117.1	62.5	-	-	
概 評		少	少	多	少	平年並	平年並	平年並	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

単位：%

		灰色かび病	疫病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	黄化葉巻病	モザイク病	青枯病	萎凋病	アブラムシ類	コナジラミ類(葉率)	アザミワリバエ類(花率)	ハモグバエ類(幼虫)	タバココガネ類(幼虫)	ハスモンヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0	1	0	0	総調査ほ場数：11か所 総調査株数：550株 (調査株数 50株、100花・果、葉かび・すすかび150葉、その他100葉) 夏秋トマト ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	本年値	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	9.1	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.0	2.8	1.9	13.8	3.9	0.0	0.0	0.0	10.3	26.2	6.5	3.4	3.0	0.0	
	平年比	-	-	325.0	0.0	0.0	700.0	-	-	-	0.0	104.2	0.0	267.6	0.0	-	
葉率・株率	発生株数	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	205	0	0	0	0	※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※タバココガネ類幼虫および被害は2016.6～以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	本年値	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.0	0.1	0.1	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	
	平年比	-	-	1109.0	0.0	0.0	350.0	-	-	-	0.0	3100.0	0.0	0.0	-	-	
概 評		少	少	やや多	少	少	多	少	少	少	少	多	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なす

単位：%

		うどんこ病	灰色かび病(葉率)	青枯病	半身萎凋病	輪紋病	すすかび病(葉率)	アブラムシ類	ハダニ類(葉率)	アザミワリバエ類(葉率)	ハモグバエ類(葉率)	タバココガネ類(葉率)	アザミワリバエ類(葉率)	コナジラミ類(葉率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	0	0	0	0	3	3	7	0	0	0	1	総調査ほ場数：8か所 総調査株数：400株 (調査株数 50株、100葉、100果) ※平年比＝(平均値／平年値)×100 ※シロイチモジヨトウは2016年度から調査開始。灰色かび病・アザミワリバエ・ハスモンヨトウ幼虫は2016年以降、すすかび病・ハダニ類・コナジラミ類の密度は2014年以降葉率・以前は株率調査。タバココガネ類幼虫被害率調査は2016年以降、以前は幼虫株率調査のため、平年値は参考値。
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	37.5	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.9	46.4	70.4	4.0	-	9.4	8.1	
	平年比	0.0	-	-	-	-	-	78.3	80.8	124.3	0.0	-	0.0	0.0	
株率・葉率	発生株数	0	0	0	0	0	0	9	10	43	0	0	0	1	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.3	5.4	0.0	0.0	0.0	0.1	
	平年値	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.9	15.8	0.1	-	0.3	0.2	
	平年比	0.0	-	-	-	-	-	54.9	18.7	34.1	0.0	-	0.0	0.0	
概 評		少	少	少	少	(少)	少	平年並	やや少	平年並	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

単位：%

		灰色かび病(株率)	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病(株率)	モザイク病(株率)	黄化えそ病(株率)	炭疽病	斑点細菌病	アブラムシ類	アザミワリバエ類	アザミワリバエ類(幼虫)	コナジラミ類	ハダニ類	ハモグバエ類(株率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	6	4	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	総調査ほ場数：6か所 総調査葉数：600葉 総調査株数：150株 ※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※灰色かび病はH26年度から、ハモグバエ類はH28年度から、疫病・モザイク病、黄化えそ病はH29年度から株率調査。それ以前の平年値は参考値。炭疽病、斑点細菌病はR5年度から調査。
	本年値	0.0	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	16.7	33.3	0.0	16.7	0.0	
	平年値	0.0	61.0	40.3	3.8	0.0	0.0	11.8	7.2	0.0	15.1	32.2	4.2	26.5	8.0	1.0	
	平年比	-	163.9	165.5	0.0	-	-	141.5	0.0	-	110.6	51.9	792.9	0.0	208.8	0.0	
葉率・株率	発生株数	0	282	22	0	0	0	11	0	0	100	6	42	0	1	0	※本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※灰色かび病はH26年度から、ハモグバエ類はH28年度から、疫病・モザイク病、黄化えそ病はH29年度から株率調査。それ以前の平年値は参考値。炭疽病、斑点細菌病はR5年度から調査。
	本年値	0.0	47.0	3.7	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	16.7	1.0	7.0	0.0	0.2	0.0	
	平年値	0.0	11.5	5.2	0.3	0.0	0.0	2.5	1.4	0.0	1.1	2.9	0.1	1.7	0.4	0.0	
	平年比	-	408.7	71.2	0.0	-	-	292.0	0.0	-	1518.2	34.5	7000.0	0.0	50.0	-	
概 評		少	やや多	やや多	少	少	少	やや多	(少)	(少)	やや多	やや少	多	少	平年並	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なし

単位：％

		黒星病	黒斑病	赤星病	ハダニ類	ハマキムシ類被害枝率	サビダニ類被害枝率	アブラムシ類寄生枝率	備考
ほ場率	発生ほ場数	6	0	7	0	0	0	2	総調査ほ場数：26か所 総調査葉数：10,400葉 (調査葉数 400葉) 総調査枝・果実数：2,600枝・果実 (調査枝・果実数 100枝・果実)
	本年平均値	23.1	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	7.7	
	平年値	17.3	0.4	11.3	1.5	0.7	25	32.4	
	平年比	133.5	0.0	238.1	0.0	0.0	0.0	23.8	
葉率・枝率	発生程度	平年並	少	多	少	少	少	やや少	※平年比＝(平均値／平年値)×100 ※サビダニ類被害枝率は2016年度から調査開始 ※ハマキムシ類被害枝率は2015年度から調査開始以前は葉での幼虫調査
	発生葉数	22	0	53	0	0	0	18	
	本年平均値	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	
	平年値	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	4.2	3.4	
概 評	平年比	200.0	-	500.0	-	-	0.0	20.6	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生程度	多	少	多	少	少	少	やや少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

りんご

単位：％

		斑点落葉病	赤星病	褐斑病	黒星病	輪紋病(果実)	ハダニ類	ハマキムシ類幼虫	アブラムシ類	シンクイムシ類(果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	3	1	3	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：7か所 総調査葉数：2,800葉 (調査葉数 400葉) (調査果実数 100果)
	本年平均値	42.9	14.3	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	22.9	1.4	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	4.8	1.4	
	平年比	187.3	1021.4	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	
葉率	発生程度	多	多	多	少	少	少	少	少	少	※平年比＝(本年平均値／平年値)×100 ※黒星病はH28年度から調査
	発生葉数	3	0	18	0	0	0	0	0	0	
	本年平均値	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
概 評	平年比	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生程度	やや少	少	多	少	少	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位：％

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	ヨナジラミ類	ハスモンヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	2	2	1	0	0	0	総調査ほ場数：10か所 総調査株数：500株 (調査株数 50株)
	本年値	0.0	20.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	13.1	8.6	55.9	20.3	0.0	3.0	0.0	
	平年比	0.0	232.6	35.8	49.3	-	0.0	-	
株率	発生程度	少	多	やや少	やや少	少	少	少	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比＝(平均値／平年値)×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生株数	0	6	6	1	0	0	0	
	本年値	0.0	1.2	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.9	1.9	16.0	3.0	0.0	0.1	0.0	
概 評	平年比	0.0	63.2	7.5	6.7	-	0.0	-	※シロイチモジヨトウの発生はなかった。
	発生程度	少	平年並	少	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す