

水稻(7月下旬～8月上旬)

単位：％

	葉いもち	葉いもち 上位3葉	紋枯病	縞葉枯病	心枯茎※	ごま葉枯病	白葉枯病	イネツトムシ	備 考
県全体発生ほ場率(A)(%)	0.0	0.0	12.7	36.5	15.9	3.2	3.2	1.6	令和8(2026)年7月21日～7月28日調査 総調査ほ場数：63 ※ $\text{平年比} = (\text{発生ほ場率} / \text{平年値}) \times 100$ ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ○葉いもち(上位3葉)の発生量は平年並 ○葉いもちの発生程度は一部除きD(面積0.5%) ○紋枯病の発生程度はD(第3葉鞘以下) ○白葉枯病は確認されず
平年値(B)(%)	37.0	17.1	36.9	46.5	8.4	5.1	-	4.1	
(A)／(B)×100	0.0	0.0	34.4	78.4	187.9	62.4	-	39.0	
発生程度	少	少	やや少	平年並	多	平年並	(多)	やや少	
県全体発生株率(A)(%)	0.0	0.0	0.3	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	
平年値(B)(%)	2.7	1.1	3.6	1.3	0.1	0.2	-	0.1	
(A)／(B)×100	0.0	0.0	8.3	111.1	385.6	6.9	-	0.0	
発生程度	少	少	少	平年並	多	少	(多)	少	
概 評	少	少	やや少	平年並	多	やや多	(多)	平年並	
	葉いもち	葉いもち 上位3葉	紋枯病	縞葉枯病	心枯茎※	ごま葉枯病	白葉枯病	イネツトムシ	備 考
県北部発生株率(A)(%)	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数：26
平年値(B)(%)	2.9	0.9	1.7	0.3	0.1	-	-	0.1	
(A)／(B)×100	0.0	0.0	18.4	88.5	564.1	-	-	0.0	
発生程度	少	少	少	平年並	多	-	-	少	
県中部発生株率(A)(%)	0.0	0.0	0.4	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	総調査ほ場数：21
平年値(B)(%)	1.0	0.3	2.7	1.7	0.1	-	-	0.0	
(A)／(B)×100	0.0	0.0	16.0	141.9	83.3	-	-	0.0	
発生程度	少	少	少	やや多	平年並	-	-	やや多	
県南部発生株率(A)(%)	0.0	0.0	0.1	1.9	0.3	0.0	0.1	0.0	総調査ほ場数：16
平年値(B)(%)	5.8	2.6	8.3	2.6	0.0	-	-	0.2	
(A)／(B)×100	0.0	0.0	1.5	72.4	5833.3	-	-	0.0	
発生程度	少	少	少	平年並	多	-	-	少	

* 葉いもち・紋枯病は100株、縞葉枯病・ごま葉枯病・白葉枯病・心枯茎・イネツトムシは300株調査
※ 心枯茎：ニカメイガの被害によるものを調査した

水田におけるすくい取り(7月下旬)

		葉齧米 カメムシ類 成幼虫	大型 カメムシ類 合計	クモヘリ カメムシ 成幼虫	ホソハリ カメムシ 成幼虫	イネ カメムシ 成幼虫	ミナミアオ カメムシ 成幼虫	イネホソミドリ・アカスジ カメムシ類 成幼虫	備考
発 生 ほ場率	発生ほ場数(か所)	15	9	8	1	1	0	8	総調査ほ場数：64ほ場 (20回振り) すくい取り 平年値はH28(2016)～ R7(2025)年の平均
	発生ほ場率 [A] (%)	23.4	14.1	12.5	1.6	1.6	0	12.5	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	32.6	17.0	14.4	4.7	1.1	0	21.8	
	([A] ／ [B]) × 100	71.9	82.9	87.0	33.8	146.3	0.0	57.5	
	発生程度	平年並	平年並	平年並	やや少	やや多	少	やや少	
頭 数	すくい取り頭数合計 (頭)	131	74	69	2	3	0	57	※イネカメムシ、ミナミアオカメムシの平年値は R3(2021)～R7(2025)年の 平均
	すくい取り頭数平均値 [C] (頭)	2.05	1.20	1.10	0.03	0.05	0	0.90	
	すくい取り頭数平年値 [D] (頭)	1.60	0.82	0.73	0.09	0.02	0	0.77	
	([C] ／ [D]) × 100	127.9	146.3	150.7	33.3	235.7	-	116.9	
	発生程度	平年並	やや多	やや多	やや少	多	少	平年並	
概 評		平年並	やや多	やや多	やや少	多	少	平年並	

		ウンカ類 幼虫	ヒメトビ ウンカ成 虫	セジロウ ナカ成虫	ヨコバイ 類幼虫	ツマグロ ヨコバイ 成虫	イナズマ ヨコバイ 成虫	イナゴ	イネミズ ソウムシ	フタオビ コヤガ幼 虫	イチモン ジセリ 幼虫	備考
発 生 ほ場率	発生ほ場数(か所)	46	62	2	9	21	1	29	7	1	3	総調査ほ場数：64ほ場 (20回振り) すくい取り 平年値はH28(2016)～ R7(2025)年の平均
	発生ほ場率 [A] (%)	71.9	96.9	3.1	14.1	32.8	1.6	45.3	10.9	1.6	4.7	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	94.0	97.0	17.9	37.4	59.3	1.8	55.2	25.0	2.9	5.0	
	([A] ／ [B]) × 100	76.5	99.9	17.3	37.7	55.3	88.9	82.1	43.6	55.2	94.0	
	発生程度	平年並	平年並	少	やや少	やや少	平年並	平年並	やや少	やや少	平年並	
頭 数	すくい取り頭数合計 (頭)	1,556	1136	2	15	37	1	120	21	1	3	※イネカメムシ、ミナミアオカメムシの平年値は R3(2021)～R7(2025)年の 平均
	すくい取り頭数平均値 [C] (頭)	24.3	17.8	0.0	0.2	0.6	0.02	1.9	0.3	0.0	0.0	
	すくい取り頭数平年値 [D] (頭)	303.5	38.1	0.4	17.6	18.4	0.04	2.8	0.9	0.1	0.1	
	([C] ／ [D]) × 100	8.0	46.7	0.0	1.1	3.3	50.0	67.9	33.3	0.0	0.0	
	発生程度	少	やや少	少	少	やや少	やや少	平年並	やや少	少	やや少	
概 評		やや少	平年並	少	やや少	やや少	平年並	平年並	やや少	やや少	やや少	

大豆

		べと病	カメムシ類 成・幼虫 (頭数)	カメムシ類 成虫 (頭 数)	カメムシ類 幼虫 (頭 数)	その他テ ウ目幼虫 (頭数)	フタスジ メハムシ (頭数)	アブラムシ (株数)	シロイチモ ジヨウ (頭数)	コガナムシ (株数)	備考
発生ほ場数 (か所)		10	2	2	0	18	4	2	4	0	総調査ほ場数：28か所
ほ場率 (%)	本年平均値	35.7	7.1	7.1	0.0	64.3	14.3	7.1	14.3	0.0	総調査株数：700株
	平年値	62.0	20.6	19.1	2.6	68.2	11.0	30.1	0.8	4.0	(調査株数：1ほ場25株)
	平年比	57.6	34.5	37.2	0.0	94.3	130.0	23.6	1787.5	0.0	
	発生程度	やや少	やや少	やや少	少	平年並	平年並	やや少	多	少	平年値はH28(2016)～R7(2025)年の平均
頭数又は株数合計 (頭、株)		160	1	1	0	31	6	3	3	0	※平年比＝(本年平均値／平年値)×100
頭数 株率 (%)	本年平均値	22.9	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.1	0.1	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年値	34.3	0.3	0.3	0.0	2.2	0.3	0.9	0.0	0.1	
	平年比	66.8	13.3	13.3	－	50.0	66.7	11.1	－	0.0	
	発生程度	平年並	少	少	少	やや少	平年並	少	－	少	
概 評		やや少	やや少	やや少	少	平年並	平年並	やや少	多	少	

※) ハスモンヨトウは卵塊、幼虫のいる白変葉、幼虫の有無を調査

		ハスモン ヨトウ (発生の 有無)	ハスモン ヨトウ白 変葉 (株 数)	ハスモン ヨトウ卵 塊数	ハスモン ヨトウ若 齢幼虫コ ロニー数	ハスモン ヨトウ中 老齢幼虫 数	備考
発生ほ場数(か所)		2	0	0	0	2	総調査ほ場数: 28 総調査株数: 700株 (調査株数: 1ほ場25株) 平年値はH28(2016)～R7(2025)年の平均
発 生 ほ場率	発 生 ほ 場 率 [A] (%)	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	20.3	6.1	0.3	3.4	17.6	
	([A] / [B]) × 100	35.0	0.0	0.0	0.0	40.3	
	発生程度	やや少	少	少	少	やや少	
葉数又は頭数合計 (葉、頭)		-	0	0	0	1	※調査株数にカウントされるほどではない が、ほ場内で発生が見られる場合は散見とし て発生ほ場数にカウント
発 生 程度	葉数又は頭数平均値 [C] (葉、頭)	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
	葉数又は頭数平年値 [D] (葉、頭)	-	0.1	0.0	0.0	0.5	
	([C] / [D]) × 100	-	0.0	-	-	0.0	
	発生程度	少	少	少	少	少	
概 評		やや少	-	-	-	-	

いちご(育苗)

		炭疽病	灰色か び病	うどん こ病	萎黄病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	コナジ ラミ類	ハスモ ンヨト ウ幼虫	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫	備考
ほ 場 率	発生ほ場数	2	0	2	1	2	15	3	0	0	総調査ほ場数: 59か所 総調査株数: 1,450株 (調査株数 25株) ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均 値を示す
	本年値	3.4	0.0	3.4	1.7	3.4	25.4	5.1	0.0	0.0	
	平年値	5.7	0.0	3.1	0.7	15.4	20.6	1.6	1.6	0.0	
	平年比	59.6	-	109.7	242.9	22.1	123.3	318.8	0.0	-	
発 生 株 率	発生株数	0	0	3	0	2	56	3	0	0	※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※調査株数にカウントされるほどではない が、ほ場内で発生が見られる場合は散見と して発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	3.9	0.2	0.0	0.0	
	平年値	0.1	0.0	0.1	0.1	2.6	3.5	0.0	0.1	0.0	
	平年比	0.0	-	200.0	0.0	3.8	111.4	-	0.0	-	
発 生 程 度	発生程度	少	少	多	少	少	平年並	-	少	少	
	概 評	やや少	(少)	やや多	平年並	やや少	平年並	(多)	少	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

		灰色 かび 病	疫病	葉か び病	すす かび 病	うどん こ病	黄化 葉巻 病	黄化 病	モザ イク 病	青枯 病	萎凋 病	アブ ラム シ類	コナ ジラ ミ類 (葉 率)	アザ ミウ マ類 (花 率)	ハモ グリ バエ 類幼 虫	タバ コガ 類幼 虫	トマ トバ ガ	備考
ほ 場 率	発生ほ場数	0	0	0	0	8	5	4	0	0	0	0	7	0	2	0	0	総調査ほ場数: 8か所 総調査株数: 400株 (調査数:50株、100花・果、葉かび・すすかび 150葉、その他100葉) ※夏秋トマト ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均 値を示す ※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以 前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	62.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5	0.0	25.0	0.0	0.0	
	平年値	3.6	0.0	15.3	34.7	44.4	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	63.6	0.0	17.8	0.0	33.3	
	平年比	0.0	-	0.0	0.0	225.2	543.5	-	-	-	-	0.0	137.6	-	140.4	-	0.0	
葉 率・ 株 率	発生程度	少	少	少	少	多	多	-	少	少	少	少	平年並	少	やや多	少	少	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均 値を示す ※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以 前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	発生株数	0	0	0	0	250	15	52	0	0	0	0	247	0	38	0	0	
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	3.8	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	9.5	0.0	0.0	
	平年値	0.7	0.0	6.7	14.0	12.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	13.1	0.0	2.2	0.0	6.3	
概 評	平年比	0.0	-	0.0	0.0	504.0	181.0	-	-	-	-	0.0	235.9	-	431.8	-	0.0	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均 値を示す ※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以 前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	発生程度	少	少	少	少	多	多	-	少	少	少	少	多	少	多	少	少	
	概 評	少	少	少	少	多	多	(やや多)	(少)	(少)	(少)	(少)	やや多	(少)	やや多	(少)	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なす

		うどん こ病	灰色か び病 (葉率)	青枯 病	半身 萎凋 病	輪紋 病	すすか び病 (葉率)	アブラ ムシ類	ハダニ 類 (葉率)	アザミウ マ類 (花率)	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫 (葉率)	ハダニ 類 (葉率)	ハダニ 類 (葉率)	ハダニ 類 (葉率)	ハダニ 類 (葉率)	ハダニ 類 (葉率)	ハダニ 類 (葉率)	備考
ほ 場 率	発生ほ場数	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6	総調査ほ場数: 8か所 総調査株数: 400株 (調査数 50株、100葉、100果) ※平年比＝(平均値／平年値)×100
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	
	平年値	21.8	0.0	6.9	3.3	0.0	4.9	31.9	34.4	55.2	2.4	1.1	9.4	2.5	62.0	0.0	121.0	
	平年比	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	39.2	72.7	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
株 率・ 葉 率	発生程度	少	少	少	少	少	少	やや少	平年並	やや少	少	少	少	少	少	平年並	平年並	※シロイチモジヨトウは2016年度から調査開始。灰色かび 病・アザミウマ類・ハスモンヨトウ幼虫は2016年以降、すすか び病・ハダニ類・コナジラミ類の密度は2014年以降葉率。以前 は株率調査。タバコガ類幼虫被害率調査は2016年以降、以 前は幼虫株率調査のため、平年値は参考値。
	発生株・葉数	0	0	0	0	0	0	1	17	2	0	0	0	0	0	24	0	
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	
	平年値	2.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.5	2.9	2.5	3.5	0.0	0.0	0.2	0.1	4.4	0.0	0.0	
概 評	平年比	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	10.2	83.7	8.5	0.0	-	0.0	0.0	0.0	67.7	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発 生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	平年並	やや少	少	少	少	少	少	平年並	平年並	
	概 評	(少)	(少)	少	少	(少)	少	やや少	平年並	やや少	少	(少)	少	少	少	平年並	平年並	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ねぎ

単位：％													
		さび病	べと病	黒斑症状	軟腐病	萎縮病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	ハスモンヨトウ幼虫	ネギコガ幼虫	シロイチモジヨトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	8	0	0	0	8	1	0	0	0	総調査ほ場数：8か所
	本年値	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	12.5	0.0	0.0	0.0	総調査株数：400株
	平年値	14.3	1.3	96.3	0	0	0.0	63.6	2.5	0.0	1.3	12.5	(調査株数 50株)
	平年比	0.0	0.0	103.8	-	-	-	157.2	500.0	-	0.0	0.0	
	発生程度	少	少	平年並	少	少	少	やや多	多	少	少	少	※平年比＝（平均値／平年値）×100
株率	発生株数	0	0	182	0	0	0	390	1	0	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内
	本年値	0.0	0.0	45.5	0.0	0.0	0.0	97.5	0.3	0.0	0.0	0.0	で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数に
	平年値	2.2	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	37.7	0.6	0.0	0.0	0.6	カウント
	平年比	0.0	-	163.7	-	-	-	258.6	50.0	-	-	0.0	
	発生程度	少	少	やや多	少	少	少	多	やや少	少	少	少	※シロイチモジヨトウ幼虫はR2年度から調査
概 評		少	(少)	やや多	(少)	(少)	(少)	多	平年並	(少)	(少)	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なし

		単位：％										備考
		黒星病	黒星病(果実)	黒斑病	赤星病	ハダニ類	ハマキムシ類被害枝率	アブラムシ類寄生枝率	シンクイムシ類(果実)	カメムシ類(果実)	カイガラムシ類(果実)	
ほ場率	発生ほ場数	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	総調査ほ場数：25か所 総調査葉数：10,000葉 (調査葉数 400葉) 総調査枝・果実数：2,600枝・果実 (調査枝・果実数 100枝・果実) ※平年比＝（平均値／平年値）×100 ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	11.8	14.3	0.0	9.3	28.3	2.6	6.7	0.4	2.6	0.0	
	平年比	0.0	0.0	－	0.0	84.8	0.0	59.7	0.0	0.0	－	
	発生程度	少	少	少	少	平年並	少	やや少	少	少	少	
葉率・果率・枝率	発生葉数	0	0	0	0	438	0	2	0	0	0	
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.1	0.3	0.0	0.1	1.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
	平年比	0.0	0.0	－	0.0	231.6	0.0	100.0	－	－	－	
	発生程度	少	少	少	少	多	少	平年並	少	少	少	
概 評		少	少	(少)	少	やや多	少	やや少	(少)	(少)	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ぶどう

		単位：％									備考
		べと病 （葉）	晩腐病 （花穂）	黒とう 病 （花穂）	灰色か び病 （葉）	ハマキ ムシ類 （花穂）	アザミ ウマ類 （花穂）	アブラ ムシ類 （葉）	ハダニ 類 （葉）		
ほ場率	発生ほ場数	0	0	3	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：9か所	
	本年値	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査葉・花穂数：900葉・花穂	
	平年値	23.0	9.1	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	（調査葉・花穂数：100葉・花穂）	
	平年比	0.0	0.0	1110.0	－	－	0.0	－	－	※平年比＝（本年平均値／平年値）×100	
	発生程度	少	少	多	少	少	少	少	少	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す	
葉・花穂率	発生葉数	0	0	2	0	0	0	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント	
	本年値	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	平年値	1.1	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	平年比	0.0	0.0	100.0	－	－	－	－	－		
	発生程度	少	少	平年並	少	少	少	少	少		
概 評		少	少	やや多	（少）	（少）	少	（少）	（少）		

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

りんご

		斑点落葉病	赤星病	褐斑病	黒星病	輪紋病(果実)	ハダニ類	ハマキムシ類幼虫	アブラムシ類	シンクイムシ類(果実)	カメムシ類(果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：7か所 総調査葉数：2,800葉 (調査葉数 400葉) (調査果実数 100果) ※ $\text{平年比} = (\text{本年平均値} / \text{平年値}) \times 100$ ※黒星病はH28年度から調査 ※カメムシ類はR6年度から調査 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年平均値	57.1	0.0	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	60.0	0.0	62.9	0.0	2.9	7.4	4.3	9.8	0.0	50.0	
	平年比	95.2	－	136.2	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	
	発生程度	平年並	少	多	少	少	少	少	少	少	少	
葉率	発生葉数	88	0	229	0	0	0	0	0	0	0	
	本年平均値	3.1	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.1	0.0	1.3	0.0	0.0	0.6	0.1	0.4	0.0	0.2	
	平年比	281.8	－	630.8	－	－	0.0	0.0	0.0	－	0.0	
	発生程度	多	少	多	少	少	少	少	少	少	少	
概 評		やや多	(少)	多	(少)	少	少	少	少	(少)	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が－となっているものの概評を示す

きく

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	4	0	0	0	総調査ほ場数：9か所 総調査株数：450株 (調査株数 50株) ※ $\text{本年値} = \text{本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す}$ ※ $\text{平年比} = (\text{平均値} / \text{平年値}) \times 100$ ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	
	平年値	5.3	11.4	60.8	7.3	0.0	2.0	
	平年比	0.0	0.0	73.0	0.0	－	0.0	
	発生程度	少	少	平年並	少	少	少	
株率	発生株数	0	0	21	0	0	0	
	本年値	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.3	1.2	18.5	0.3	0.0	0.0	
	平年比	0.0	0.0	25.4	0.0	－	－	
	発生程度	少	少	やや少	少	少	少	
概 評		少	少	平年並	少	(少)	(少)	

注) 概評の()は、発生程度(本年値と平年値の比較)が－となっているものの概評を示す