病害虫発生現況情報（令和8(2026)年11月）

栃木県農業総合研究センター
環境技術指導部

水稲（ウンカ類・ヨコバイ類の越冬前密度）

単位：%、10㎡あたりの頭数

		ウンカ類幼虫	ヒメトビウンカ成虫	その他ウンカ類成虫	ヨコバイ類幼虫	ツマグロヨコバイ成虫	イナズマヨコバイ成虫	その他のヨコバイ類成虫	備考
発生ほ場数		11	1	0	11	2	1	13	総調査ほ場数：17ほ場 調査方法：背負型動力機を使用した吹き出し法で0.3m×11mを取り調査した。 ※頭数合計は10㎡あたりに換算（×3）。 ※密度＝頭数／10㎡ ※本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値 ※平年値は過去10年の平均値 ※平年比＝（本年値／平年値）×100
ほ場率	本年値	64.7	5.9	0.0	64.7	11.8	5.9	76.5	
	平年値	80.0	14.6	6.8	60.9	19.6	4.8	80.8	
	平年比	80.9	40.3	0.0	106.2	60.0	122.5	94.6	
	発生程度	平年並	やや少	少	平年並	平年並	平年並	平年並	
頭数合計		240	3	0	855	6	3	2241	
密度	本年値	14.1	0.2	0.0	50.3	0.4	0.2	131.8	
	平年値	45.7	0.8	0.4	84.7	2.5	0.3	185.5	
	平年比	30.9	22.1	0.0	59.4	14.1	58.8	71.1	
	発生程度	やや少	やや少	少	やや少	少	やや少	平年並	
概評		平年並	やや少	少	平年並	やや少	平年並	平年並	

いちご（本ぽ）

単位：%

		炭疽病	灰色かび病	うどんこ病	萎黄病	アブラムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ幼虫	シロイチモジヨトウ幼虫	アザミウマ類（花）	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	0	19	0	5	29	7	1	0	3	総調査ほ場数：61か所　総調査株数：1,575株 （調査株数　25株）
	本年値	1.6	0.0	31.1	0.0	8.2	47.5	11.5	1.6	0.0	4.9	
	平年値	10.3	0.0	5.3	2.5	4.8	19.9	13.8	7.5	0.0	10.2	
	平年比	15.5	－	586.8	0.0	170.8	238.7	83.3	21.3	－	48.0	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比＝（本年値／平年値）×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生程度	少	少	多	少	やや多	多	平年並	やや少	少	やや少	
発生株率	発生株数	0	0	122	0	14	211	15	1	0	2	
	本年値	0.0	0.0	7.7	0.0	0.9	13.4	1.0	0.1	0.0	0.1	
	平年値	0.2	0.0	0.8	0.0	0.4	5.3	0.9	0.4	0.0	0.5	
	平年比	0.0	－	962.5	－	225.0	252.8	111.1	25.0	－	20.0	
	発生程度	少	少	多	少	多	多	平年並	やや少	少	やや少	
概評		少	(少)	多	少	やや多	多	(平年並)	やや少	(少)	やや少	

注）概評の（　）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度（本年値と平年値の比較）が－となっているものの概評を示す

トマト

単位：%

		灰色かび病	疫病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	黄化葉巻病	黄化病	モザイク病	青枯病	萎凋病	アブラムシ類	コナジラミ類（葉率）	アザミウマ類（花率）	ハモグリバエ類幼虫	タバコガ類幼虫	ハスモンヨトウ幼虫	トマトキバガ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	0	8	3	3	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：20か所
	本年値	0.0	0.0	0.0	40.0	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査株数：1,000株 （調査数:50株、100花・果、葉かび・すすかび150葉、その他100葉） ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比＝（本年値／平年値）×100 ※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	平年値	1.0	0.0	4.5	20.1	1.5	9.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	31.7	0.0	0.5	0.0	1.3	0.0	
	平年比	0.0	－	0.0	199.0	1000.0	151.5	3000.0	－	－	－	0.0	63.1	－	0.0	－	0.0	－	
	発生程度	少	少	少	多	多	やや多	多	少	少	少	少	平年並	少	少	少	少	少	
葉率・株率	発生株数	0	0	0	15	14	7	7	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	
	本年値	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.0	0.2	3.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年比	－	－	0.0	50.0	－	140.0	－	－	－	－	－	36.4	－	－	－	－	－	
	発生程度	少	少	少	やや少	－	平年並	－	少	少	少	少	やや少	少	少	少	少	少	
概評		少	少	少	やや多	(多)	やや多	(多)	(少)	(少)	(少)	(少)	平年並	(少)	少	(少)	(少)	(少)	

注）概評の（　）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度（本年値と平年値の比較）が－となっているものの概評を示す

きゅうり

単位：%

		灰色かび病（株率）	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病（株率）	ﾓｻﾞｲｸ病（株率）	黄化えそ病（株率）	炭疽病	斑点細菌病	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類幼虫	ｺﾅｼﾞﾗﾐ類	ﾊﾀﾞﾆ類	ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ幼虫（株率）	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	総調査ほ場数：3か所
	本年値	0.0	66.7	66.7	66.7	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	総調査葉数：300葉
	平年値	0.0	54.9	31.9	17.6	0.0	2.0	16.4	8.3	0.0	1.3	19.5	6.7	48.5	5.0	1.4	総調査株数：75株
	平年比	－	121.5	209.1	379.0	－	0.0	0.0	803.6	－	0.0	342.1	0.0	137.5	0.0	0.0	
	発生程度	**少**	**平年並**	**多**	**多**	**少**	**少**	**少**	**多**	**少**	**少**	**多**	**少**	**平年並**	**少**	**少**	※平年比＝（本年値／平年値）×100
葉率・株率	発生葉・株数	0	64	6	60	0	0	0	53	0	0	16	0	37	0	0	※本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	本年値	0.0	21.3	2.0	20.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	5.3	0.0	12.3	0.0	0.0	※灰色かび病はH26年度から，ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ幼虫はH28年度から，疫病，モザイク病，黄化えそ病はH29年度から株率調査。それ以前の平年値は参考値。炭疽病、斑点細菌病はR5年度から調査。
	平年値	0.0	11.6	4.2	3.6	0.0	0.3	1.6	2.3	0.0	0.0	2.2	1.4	14.0	0.5	0.1	
	平年比	－	183.6	47.6	555.6	－	0.0	0.0	780.8	－	－	240.9	0.0	87.9	0.0	0.0	
	発生程度	**少**	**多**	**やや少**	**多**	**少**	**少**	**少**	**多**	**少**	**少**	**多**	**少**	**平年並**	**少**	**少**	
概　評		**(少)**	**やや多**	**やや多**	**多**	**(少)**	**(少)**	**少**	**(多)**	**(少)**	**少**	**多**	**少**	**平年並**	**(少)**	**(少)**	

注）概評の（ ）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が－となっているものの概評を示す

にら

単位：%

		白斑葉枯病	乾腐病	さび病	株腐細菌病	ネダニ類	アザミウマ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	2	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：17か所
	本年値	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査株数：850株
	平年値	6.2	1.1	0.0	0.0	4.4	13.6	（調査株数　50株）
	平年比	190.3	0.0	－	－	0.0	0.0	※平年比＝（平均値／平年値）×１００
	発生程度	**多**	**少**	**少**	**少**	**少**	**少**	※株率の平年値は過去10年の値
株率	発生株数	0	0	0	0	0	0	※本年値は、本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年値	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	
	平年比	0.0	－	－	－	－	0.0	
	発生程度	**少**	**少**	**少**	**少**	**少**	**少**	
概　評		**平年並**	**(少)**	**(少)**	**(少)**	**少**	**少**	

注）概評の（ ）は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が－となっているものの概評を示す

きく

単位：%

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	1	2	0	0	0	総調査ほ場数：9か所
	本年値	0.0	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	総調査株数：450株
	平年値	3.0	5.2	47.6	2.3	0.0	8.0	（調査株数　50株）
	平年比	0.0	213.5	46.6	0.0	－	0.0	
	発生程度	**少**	**多**	**やや少**	**少**	**少**	**少**	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
株率	発生株数	0	0	4	0	0	0	※平年比＝（平均値／平年値）×100
	本年値	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.7	0.3	10.7	0.3	0.0	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年比	0.0	0.0	8.4	0.0	－	－	
	発生程度	**少**	**少**	**少**	**少**	**少**	**少**	
概　評		**少**	**平年並**	**やや少**	**少**	**(少)**	**(少)**	

注）概評の（ ）は、発生程度(本年値と平年値の比較)が－となっているものの概評を示す